

ORAL HEALTH ASSESSMENT TOOL 日本語版 (OHAT-J)

(Chalmers JM, 2005; 松尾, 2016)

ID:	氏名:	評価日: / /			スコア				
項目		0 = 健全		1 = やや不良		2 = 病的	症例1	症例2	症例3
口唇		正常, 湿潤, ピンク		乾燥, ひび割れ, 口角の発赤		腫脹や腫瘍, 赤色斑, 白色斑, 潰瘍性出血, 口角からの出血, 潰瘍			
舌		正常, 湿潤, ピンク		不整, 龟裂, 発赤, 舌苔付着		赤色斑, 白色斑, 潰瘍, 肿脹			
歯肉・粘膜		正常, 湿潤, ピンク		乾燥, 光沢, 粗造, 発赤 部分的な(1-6歯分)腫脹 義歯下の一部潰瘍		腫脹, 出血(7歯分以上) 歯の動搖, 潰瘍 白色斑, 発赤, 圧痛			
唾液		湿潤, 漿液性		乾燥, べたつく粘膜, 少量の唾液 口渴感若干あり		赤く干からびた状態 唾液はほぼなし, 粘性の高い唾液 口渴感あり			
残存歯		歯・歯根のう蝕または破折なし		3本以下のう蝕, 歯の破折, 残根, 咬耗		4本以上のう蝕, 歯の破折, 残根 非常に強い咬耗 義歯使用無しで3本以下の残存歯			
義歯		正常 義歯, 人工歯の破折なし 普通に装着できる状態		一部位の義歯, 人工歯の破折 毎日1-2時間の装着のみ可能		二部位以上の義歯, 人工歯の破折 義歯紛失, 義歯不適のため未装着 義歯接着剤が必要			
口腔清掃		口腔清掃状態良好 食渣, 歯石, ブラーケなし		I-2部位に 食渣, 歯石, ブラーケあり 若干口臭あり		多くの部位に 食渣, 歯石, ブラーケあり 強い口臭あり			
歯痛	 0 1	疼痛を示す 言動的, 身体的な兆候なし	 2 3	疼痛を示す言動的な兆候あり: 顔を引きつらせる、口唇を噛む 食事しない、攻撃的になる	 4	疼痛を示す身体的な兆候あり: 頬、歯肉の腫脹、歯の破折、潰瘍 歯肉下膿瘍。言動的な兆候もあり			
歯科受診	(要 · 不要)	再評価予定日	/ /			合計			

Japanese Translation: Koichiro Matsuo permitted by The Iowa Geriatric Education Center

available for download: <https://www.ohcw-tmd.com/research/> revised Sept 1, 2021

日本語版作成:東京医科歯科大学大学院地域・福祉口腔機能管理学分野 教授 松尾 浩一郎